



ยารา

ความรู้ปลูกแรงบันดาลใจ

โปรแกรมการใส่ปุ๋ยสำหรับลำไย



หลังตัดแต่งกิ่ง บำรุงใบ



ใบแก่/เร่งดอก



ก่อนดอกบาน
(ป้องกันดอกร่วง)



ติดผลเล็ก
(หัวไม้ขีด-เม็ดหัวเหลือง)



บำรุงผล



ยารามีล่า 16-16-16 อัตรา 2 กก./ต้น
ร่วมกับ
ยาราลีวา ไนโตรบอร์ อัตรา 1 กก./ต้น
และ ยาราวีต้า อูมาซิงค์
อัตรา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่น 2 ครั้ง ทุกๆ 7-14 วัน



ยารามีล่า ดับเบิ้ล
อัตรา 2 กก./ต้น
และยาราวีต้า ฟรุเทรล 50 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร
ฉีดพ่น 2 ครั้ง ทุกๆ 10-14 วัน



ยาราลีวา ไนโตรบอร์
อัตรา 0.5 กก./ต้น



ยารามีล่า วินเนอร์ อัตรา 2 กก./ต้น
ร่วมกับ
ยาราลีวา ไนโตรบอร์ อัตรา 1 กก./ต้น



ยารามีล่า วินเนอร์
อัตรา 2 กก./ต้น (ทุกๆ 15 วัน)
และยาราวีต้า แคลซิฟลัส 15 ซีซี
ต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นห่างกัน
10-14 วัน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว

ข้อควรสำคัญ • อัตราการใช้เทียบจากลำไย 25 ต้น/ไร่
• ควรอ่านฉลากให้ละเอียดทุกครั้งเมื่อใช้ยาราวีต้าร่วมกับสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อนักวิชาการเกษตรในพื้นที่
ธาตุอาหารเสริมในผลิตภัณฑ์ยารา
• ยาราลีวา ไนโตรบอร์ 15N +25.6CaO
• ยารามีล่า ดับเบิ้ล 8-24-24
• ยารามีล่า วินเนอร์ 15-9-20 +TE

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารกสิกรรมวิจัยแห่งชาติ (อวท.) ห้องที่ 2709-2713 ชั้นที่ 27
689 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-261-3242



ยารา ประเทศไทย



www.yara.co.th



@yarathailand



ยารา ประเทศไทย