

เอกสารกำกับปุ๋ยเคมี

สูตร	23-8-8	ชื่อการค้า	ยารามิร่า	เครื่องหมายการค้า	ตรายาร่า
คุณสมบัติ	เป็นปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด ประกอบด้วยปริมาณธาตุอาหารรับรอง ดังนี้				
	ไนโตรเจนทั้งหมด (N)				23 %
	ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P ₂ O ₅)				8 %
	โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K ₂ O)				8 %

พืชที่แนะนำให้ใช้ พืชไร่ ไม้ผล พืชผัก

อัตราที่ใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

พืชไร่ เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ฝ้าย ข้าวโพด ข้าวฟ่าง

อ้อย ใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 40-60 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ดังนี้

อ้อยปลูก แบ่งใส่สองครั้งเท่าๆ กัน ครั้งแรกหลังปลูกประมาณ 1 เดือน ครั้งที่สองหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน

อ้อยตอ นอกเขตชลประทาน ครั้งแรกต้นฤดูฝน ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยที่เหลือหลังจากใส่ครั้งแรกประมาณ 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว

อ้อยตอ ในเขตชลประทาน ครั้งแรกใส่ทั้งหมดหลังตัดแต่งตอ ครั้งที่สองใส่ปุ๋ยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา 20-40 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากใส่ครั้งแรก 30-60 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว ควรใส่ปุ๋ยเคมีขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะ และต้องพรวนดินกลบปุ๋ยเคมี

มันสำปะหลัง ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเป็นหลุมสองข้างต้นแล้วกลบปุ๋ย ในอัตรา 60-80 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่ออายุ 1-2 เดือน หรือหลังการกำจัดวัชพืชครั้งแรก

ฝ้าย ใช้ปุ๋ยนี้ในดินทราย หรือดินร่วนปนทราย ในอัตรา 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ โรยก่อนรองก่อนปลูกฝ้าย ครั้งที่สองใส่ 25-50 กิโลกรัมต่อไร่ โรยสองข้างแถวฝ้ายแล้วพรวนดินกลบโคน เมื่อฝ้ายอายุ 25-30 วัน ก่อนใส่ปุ๋ยจะต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อย

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ใช้ปุ๋ยนี้ในที่เป็นดินร่วนปนทราย หรือดินทราย ในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้งๆ ละ เท่าๆ กัน ครั้งแรกใส่ตอนเตรียมดิน ก่อนปลูกพืชเล็กน้อย ครั้งที่สองใส่โรยข้างแถวพรวนโคนต้น เมื่ออายุประมาณ 25-30 วัน ก่อนใส่ต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยเสียก่อน และหลังใส่ปุ๋ยต้องพรวนดินกลบปุ๋ยด้วย

ไม้ผล เช่น มะม่วง กัลยัย มะละกอ มะนาว องุ่น ลำไย น้อยหน่า พุเรียน เงาะ มังคุด ลำสาดี ลิ้นจี่ ฝรั่ง และส้ม ในระยะที่มีอายุ 1-3 ปี ใส่ปุ๋ยเคมีบริเวณทรงพุ่มแล้วพรวนดินกลบ ในอัตรา 1-3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ขึ้นอยู่กับขนาดของต้น ในปีหนึ่งๆ ควรใส่ปุ๋ยเคมีประมาณ 3 ครั้ง

พืชผัก เช่น กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ผักชี คื่นช่าย ผักกวางตุ้ง หอม กระเทียม พริก มะเขือ และน้ำเต้า ใส่เมื่อพืชตั้งตัวดีแล้วแบ่งใส่สองครั้ง ครั้งแรกใช้ปุ๋ยเคมีอัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีหว่านหรือรองก้นหลุม ครั้งที่สองใช้ปุ๋ยเคมีอัตราเดียวกับครั้งแรก หลังจากใส่ปุ๋ยเคมีครั้งแรก 15-30 วัน โดยวิธีโรยข้างแถว

คำแนะนำ

ควรอ่านคำแนะนำเอกสารกำกับปุ๋ยเคมีให้เข้าใจเสียก่อน หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาสงสัยให้ปรึกษาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และไม่ควรใช้เกินอัตราที่กำหนด เพราะจะเป็นอันตรายกับพืชได้

ข้อควรระวัง

1. ก่อนใส่ปุ๋ยเคมี ควรกำจัดวัชพืชให้หมดเสียก่อน เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชมาใช้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไป
2. ควรใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อดินมีความชื้นอยู่ เมื่อใส่ปุ๋ยเคมีควรกลบดิน ในกรณีที่มีการให้น้ำ ควรให้น้ำน้อยๆ ก่อน แล้วจึงเพิ่มให้มากขึ้น ถ้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ควรใส่ปุ๋ยเคมีแก่พืชในช่วงมีแสงแดดจัด ฝนไม่ตก
3. ควรหมั่นดูแลป้องกันกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชอยู่เสมอ
4. ควรเก็บปุ๋ยเคมีในภาชนะที่ปิดมิดชิด อย่าให้ถูกความชื้น แสงแดด และฝน

ผู้ผลิต : บริษัท ยาร่า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์แอดเอ็มควอเทียร์

เลขที่ 18 อาคารเดอะ ยูนิคอร์น ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

สถานที่ผลิต : เลขที่ 31 (โกดังหมายเลข 2A, 2B, 3A, 3B) หมู่ 3 ถ.บางปะอิน-บางไทร ต.ราชคราม อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

ส่งจาก : บริษัท ยาร่า ซูโอมิ ออย จำกัด ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์



ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง และอาจเป็นอันตรายหากกลืนกิน

สวมใส่ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาเมื่อใช้งาน และล้างมือให้สะอาดหลังเลิกใช้

หากเข้าดวงตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆนาที แล้วถอดคอนแทกเลนส์ออก แล้วล้างต่อ

หากยังคงมีอาการระคายเคืองดวงตา ให้รีบไปพบแพทย์

สำหรับกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีติดต่อ โทร. 001-800-12066-6751

หรือศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี 1367